

## **ASPIRIN C brustabletter**

Läs bipacksedeln noggrant. Vid behov kan Du också få ytterligare information av Din läkare eller på apoteket.

### **Vad innehåller Aspirin C?**

Aspirin C brustabletter innehåller:

Verksamma ämnen: Acetylsalicylsyra 400 mg, askorbinsyra 240 mg

Övriga ämnen: Natriumcitrat, natriumvätekarbonat, vattenfri citronsyra, vattenfri natriumkarbonat.

### **Läkemedelsform och förpackningar**

Vita, runda, släta tabletter.

Förpackning: 10 brustabletter. Brustabletterna är förpackade i folie.

### **Hur verkar Aspirin C?**

De verksamma ämnena i Aspirin C brustabletter är acetylsalicylsyra och askorbinsyra (C-vitamin). Acetylsalicylsyra tillhör gruppen salicylater och används som ett läkemedel vid smärta, värk och feber samt för att lindra svullnad relaterad till inflammatoriskt betingad smärta. Acetylsalicylsyra har redan i mindre doser konstaterats påverka även blodets koagulationsförmåga. Askorbinsyra har tillsatts för att tillfredsställa det ökade behov av C-vitamin som förekommer i samband med förkylningssjukdomar.

Från Aspirin C brustabletter som lösts i vatten absorberas acetylsalicylsyran snabbare än från konventionella tabletter, och också den irriterande effekten på magslemhinnan är mindre tack vare att Aspirin C brustabletterna är buffrade.

### **Innehavare av försäljningstillstånd och tillverkare**

Innehavare av försäljningstillstånd: Bayer Oy, Kägelstranden 12, PB 73, 02150 Esbo.

Tillverkare: Bayer Bitterfeld GmbH, Greppin, Tyskland.

### **Marknadsförare – ytterligare information lämnas av**

Bayer Oy, Consumer Care, Kägelstranden 12, PB 73, 02150 Esbo. Telefon 020 78521, telefax 020 785 8214.

### **Användningsområde**

Olika slags värk-, reuma- och febersjukdomar, t.ex. huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, reumatisk muskelvärk, feber och förkylningssjukdomar.

### **När skall Aspirin C inte användas?**

Aspirin C brustabletter lämpar sig inte för personer som är allergiska mot acetylsalicylsyra eller andra likartade smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel (salicylater).

Aspirin C brustabletter skall inte användas:

- av den som har ökad blödningsbenägenhet (t.ex. blödarsjuka, d.v.s. hemofili)
- av den som har / har haft magsår eller sår i tolvfingertarmen.

Läkemedlet rekommenderas inte under graviditet, i synnerhet inte under graviditetens tre sista månader.

### **Graviditet och amning**

Liksom andra läkemedel som innehåller salicylater rekommenderas Aspirin C brustabletter inte under graviditet, särskilt inte i graviditetens slutskede. Rådgör alltid med läkare före användning av Aspirin C under graviditet.

Acetylsalicylsyra utsöndras i små mängder i modersmjölken. Fastän tillfälligt intag av små doser inte har visat sig medföra skadeverkningar för barnet, bör läkare konsulteras om medicinerings under amning.

### **Att observera vid användning**

Vid användning av Aspirin C brustabletter skall försiktighet iakttagas och läkare vid behov rådfrågas i följande fall:

- Om Du samtidigt använder läkemedel som hämmar blodets koagulationsförmåga (t.ex. warfarin, andra kumarinderivat eller heparin); effekterna av dessa läkemedel kan förstärkas vid samtidigt intag av Aspirin C brustabletter.
- Om Du har konstaterats lida av någon njur- eller leversjukdom.
- Om Du har haft långvariga eller ofta återkommande sjukdomar i mag-tarmkanalen.
- Om Du har fått allergiska symtom (t.ex. astmaanfall, eksem, snuva) av andra antiinflammatoriska värkmedel eller antireumatiska läkemedel.
- Om Du har / har haft astma eller långvariga luftvägssjukdomar.
- Produkten hör till en grupp av läkemedel (NSAIDs), som kan försvåra möjligheten att bli gravid. Påverkan är reversibel, dvs upphör när man slutar använda dessa typer av läkemedel.

På grund av sitt natriuminnehåll är Aspirin C brustabletter inte lämpliga för personer som ordinerats saltfattig kost. Läkemedlet kan predisponera för ödem hos patienter med hjärt- eller njursvikt.

Preparat som innehåller acetylsalicylsyra rekommenderas inte som förstahandsmedel vid feber hos barn och ungdomar, eftersom dessa läkemedel i samband med virusinfektioner (såsom influensa och vattkoppor) kan öka risken för det allvarliga Reyes syndrom. Tidiga symtom är bl.a. långvariga kräkningar.

### **Interaktioner med andra läkemedel och andra möjliga interaktioner**

Läkemedelsbehandlingsverknings och effekt kan påverkas om Aspirin C används tillsammans med vissa andra läkemedel.

Rådgör med behandlande läkare innan Du intar Aspirin C tillsammans med:

- läkemedel som hämmar blodets koagulationsförmåga (t.ex. warfarin och andra kumarinderivat eller heparin)
- kortisonpreparat som tas peroralt eller ges som injektion. Samtidig användning av Aspirin C och kortison kan ge ökad risk för blödning i mag-tarmkanalen.
- andra jämförbara inflammationshämmande värkmedel
- läkemedel som hämmar bildning av blodpropp (t.ex. tiklopidin)
- vissa diabetesmedel (t.ex. glibenklamid, glipizid)
- metotrexatpreparat (som bl.a. används vid reumatoid artrit och vissa tumörsjukdomar)
- antibiotika som innehåller sulfonamider (sulfa)

- digoxin (en hjärtmedicin)
- barbiturater (t.ex. fenobarbital, ett antiepileptikum)
- läkemedel som innehåller litium (används bl.a. vid behandling av depressionstillstånd)
- natriumvalproat (medel mot epilepsi)
- urindrivande medel (t.ex. spironolakton, furosemid)
- giktmedel som ökar utsöndringen av urinsyra (probenecid)

Aspirin C i kombination med alkohol kan öka risken för blödning i mag-tarmkanalen.

## **DOSERING**

### **Dosering och administrationsätt**

Vuxna 1-2 brustabletter vid behov, högst 7 brustabletter per dygn. Åt barn 3-5 år ges 1/4 och åt barn 5-11 år hälften av en dos för vuxna. Dosen kan vid behov upprepas med 4-8 timmars mellanrum. För långvarigt bruk och åt barn under 3 år endast enligt läkarens föreskrift. Rekommenderas inte som förstahandsmedel vid feber hos barn.

Brustabletterna skall upplösas i vatten före intag.

### **Överdoser**

Vid fall av överdosering och förgiftning bör en läkare eller närmaste sjukhus kontaktas utan dröjsmål.

### **Vilka biverkningar kan Aspirin C ge?**

De vanligaste biverkningarna är olika slags symtom från mag-tarmkanalen, såsom illamående, diarré och kräkningar. I några få fall kan sår uppstå i mag-tarmkanalen och dessa kan även blöda. Buffrade brustabletter framkallar emellertid förhållandevis lindriga irritationssymtom.

Överkänslighetssymtom, t.ex. hudutslag, allergisk snuva eller astma, utvecklas stundom.

Eftersom acetylsalicylsyra påverkar blodets koagulationsförmåga kan sår blöda längre än vanligt. Symtom på överdosering kan yttra sig som yrsel och öronsus, särskilt hos barn och äldre. I dessa fall bör läkare kontaktas.

Biverkningar som eventuellt framkommer vid användning av Aspirin C skall rapporteras till läkare eller apotekspersonal.

### **Förvaring och utgångsdatum**

Aspirin C brustabletter skall förvaras i temperaturer vid högst +25 °C, på ett torrt ställe. Tabletterna skall tas ur folieförpackningen strax före användning.

Utgångsdatumet anges på förpackningen. Aspirin C brustabletter skall inte användas efter angivet utgångsdatum.

Aspirin C brustabletter skall förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

### **Datum då bipacksedeln senast reviderades**

15.6.2007