

ASPIRIN C poretabletit

Lue huolellisesti tämä pakkausseloste. Lisätietoja saat tarvittaessa myös lääkäriltä tai apteekista.

Mitä lääkevalmiste sisältää?

Aspirin C poretabletti sisältää:

Vaikuttavat aineet: Asetyyლისისყილიჰოპო 400 mg, askorbiinihappo 240 mg

Muut aineet: Natriumsitraatti, natriumvetykarbonaatti, vedetön sitruunahappo, vedetön natriumkarbonaatti

Lääkemuoto ja pakkaukset

Valkoinen, pyöreä, tasainen tabletti.

Pakkaukset: 10 poretablettia. Poretabletit on pakattu läpipainopakkaukseen.

Miten lääkevalmiste vaikuttaa?

Aspirin C poretabletti sisältää vaikuttavina aineina asetyyლისისყილიჰოპო ja askorbiinihappoa (C-vitamiinia). Asetyyლისისყილიჰოპო kuuluu salisylaattiryhmään ja sitä käytetään särky- ja kuumelääkkeenä sekä lievittämään tulehduskipuun liittyvää turvotusta. Asetyyლისისყილიჰოპო on todettu jo pienempinä annoksina vaikuttavan myös veren hyytymisominaisuuksiin. Askorbiinihappo on lisätty valmisteeseen tyydyttämään vilustumissairauksien yhteydessä lisääntyntä C-vitamiinin tarvetta.

Veteen liuotetusta Aspirin C poretabletista asetyyლისისყილიჰოპო imeytyy nopeammin kuin tavallisesta tabletista ja valmisteen mahaa ärsyttävä vaikutus on vähäisempi myös puskuroinnin ansiosta.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija: Bayer Oy, Keilaranta 12, PL 73, 02150 Espoo.

Valmistaja: Bayer Bitterfeld GmbH, Greppin, Saksa.

Markkinoija - lisätietoja antaa

Bayer Oy, Consumer Care, Keilaranta 12, PL 73, 02150 Espoo. Puhelin 020 78521, telefaksi 020 785 8214.

Käyttötarkoitukset

Erilaiset särky-, reuma- ja kuumesairaudet, kuten esim. päänsärky, hammassärky, kuukautiskivut, reumaattinen lihassärky, kuume ja vilustumistaudit.

Milloin valmistetta ei tule käyttää?

Aspirin C poretabletit eivät sovi henkilöille, jotka ovat allergisia asetyyლისისყილიჰოპო tai muille samantyyppisille kipu- ja tulehduslääkkeille (salisylaateille).

Aspirin C poretabletteja ei tulisi käyttää:

- jos on taipumusta verenvuotoihin (esim. verenvuototauti eli hemofilia).
- jos on / on ollut maha- tai pohjukaissuolihaava.

Lääkettä ei suositella käytettäväksi raskauden aikana, etenkin sen kolmen viimeisen kuukauden aikana.

Raskaus ja imetys

Aspirin C poretablettien, kuten muidenkaan salisylaatteja sisältävien lääkevalmisteiden käyttö ei ole suositeltavaa raskauden aikana, etenkin sen loppupuolella. Raskauden aikaisesta käytöstä tulisi aina neuvotella lääkärin kanssa.

Asetyyლისalisyylihappona erittyy äidinmaitoon pieninä määrinä. Vaikka satunnaisesti otettujen pienten annosten ei ole todettu aiheuttavan haittavaikutuksia lapselle, tulisi imetyksen aikaisesta käytöstä neuvotella lääkärin kanssa.

Käyttöä koskevat varotoimenpiteet

Lääkkeen käytössä tulisi noudattaa varovaisuutta ja tarvittaessa tulee kääntyä lääkärin puoleen, mikäli:

- käytätte samanaikaisesti veren hyytymistä estäviä lääkkeitä (esim. varfariini ja muut kumariinijohdokset tai hepariini); näiden lääkkeiden vaikutukset voivat voimistua Aspirin C tablettien käytön yhteydessä.
- Teillä on todettu maksa- tai munuaissairauksia.
- Teillä on pitkäaikaisia tai usein toistuvia ruoansulatuskanavan sairauksia.
- olette saaneet allergisia oireita (esim. astmakohtauksen, ihottumia, nuhaa) muista tulehduskipu- tai reumalääkkeistä.
- Teillä on / on ollut astma tai pitkäaikaisia hengitystiesairauksia.
- Valmiste kuuluu lääkeryhmään (tulehduskipulääkkeet), joka voi vaikeuttaa raskaaksi tulemistä. Tämä vaikutus kumoutuu lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen.

Natriumpitoisuutensa vuoksi valmiste ei sovellu henkilöille, joille on määrätty vähäsuolaista ruokaa. Valmiste voi lisätä turvotustaipumusta munuaisten ja sydämen toiminnanvajaustilailta.

Asetyyლისalisyylihappona valmistettuja ei suositella ensisijaiseksi kuumelääkkeeksi lapsille ja nuorille, koska virussairauksien (esim. flunssa, vesirokko) yhteydessä ne saattavat lisätä vakavan Reyen oireyhtymän vaaraa. Sen ensioireita on mm. pitkään jatkuva oksentelu.

Yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa ja muut mahdolliset yhteisvaikutukset

Lääkehoidon vaikutukset tai teho voivat muuttua, jos Aspirin C poretabletteja käytetään samanaikaisesti tiettyjen toisten lääkkeiden kanssa.

Neuvotelkaa hoitavan lääkärin kanssa ennen kuin käytätte Aspirin C poretabletteja seuraavien lääkkeiden kanssa:

- veren hyytymistä estävät lääkkeet (esim. varfariini ja muut kumariinijohdannaiset tai hepariini)
- suun kautta tai ruiskeena annosteltavat kortisonivalmisteet. Aspirin C poretablettien ja kortisonivalmisteen samanaikainen käyttö voi lisätä ruoansulatuskanavan verenvuodon vaaraa.
- muut samankaltaiset tulehduskipulääkkeet
- verisuonitukosten syntymistä ehkäisevät lääkkeet (esim. tiklopidiini)
- tietyt sokeritautilääkkeet (esim. glibenklamidi, glipitsidi)
- metotreksaattivalmisteet (käytetään mm. nivelreumassa ja tietyissä kasvainsairauksissa)
- sulfonamideja (sulfat) sisältävät antibioottivalmisteet
- digoksiini (sydänlääke)
- barbituraatit (esim. epilepsialääke fenobarbitaali)

- litiumia sisältävät lääkkeet (käytetään mm. mielialahäiriöiden hoidossa)
- epilepsialääke natriumvalproaatti
- nesteensoistossa käytettävät lääkkeet (esim. spironolaktoni, furosemidi)
- virtsahapon eritystä lisäävät kihtilääkkeet (probenesidi).

Aspirin C poretablettien ja alkoholin samanaikainen käyttö voi lisätä ruoansulatuskanavan verenvuodon vaaraa.

ANNOSTUS

Annostus ja antotapa

Aikuiset 1-2 poretablettia tarvittaessa, korkeintaan 7 poretablettia vuorokaudessa. 3-5-vuotiaille lapsille 1/4 ja 5-11-vuotiaille lapsille puolet aikuisten annoksesta. Kerta-annos voidaan tarvittaessa uusaa 4-8 tunnin välein. Jatkuvaan käyttöön ja alle 3-vuotiaille lapsille vain lääkärin ohjeen mukaan. Ei suositella ensisijaiseksi kuumelälääkkeeksi lapsille.

Poretabletit on liuotettava veteen ennen ottamista.

Yliannostus

Yliannostus- ja myrkytystapauksissa on otettava välittömästi yhteyttä lääkäriin tai lähimpään sairaalaan.

Mitä haittavaikutuksia lääke voi aiheuttaa?

Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat erilaiset ruoansulatuskanavan oireet, kuten pahoinvointi, ripuli ja oksentelu. Joskus saattaa syntyä ruoansulatuskanavan haavaumia, joihin voi liittyä verenvuotoa. Puskuroidun poretabletin aiheuttamat ärsytysoireet ovat kuitenkin suhteellisen lieviä.

Joskus voi esiintyä allergisia oireita, kuten ihottumaa, allergista nuhaa tai astmaa.

Koska asetyylilisäyhappo vaikuttaa veren hyytymisominaisuuksiin, haavat voivat vuotaa tavallista pitempään.

Yliannostuksen oireina voi esiintyä myös huimausta ja korvien soimista, erityisesti lapsilla ja vanhuksilla. Tällaisissa tapauksissa tulee kääntyä lääkärin puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset tulisi ilmoittaa lääkärille tai apteekkiin.

Säilytys ja viimeinen käyttöpäivämäärä

Aspirin C poretabletit on säilytettävä alle +25°C lämpötilassa kuivassa paikassa. Tabletit tulisi poistaa lämpösuojapakkauksesta vasta juuri ennen käyttöä.

Viimeinen käyttöpäivämäärä on painettu pakkaukseen. Aspirin C poretabletteja ei tule käyttää viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Pakkausselosteen tarkistamispäivämäärä

15.6.2007