

PAKKAUSSELOSTE

ASPIRIN® ZIPP 500mg rakeet Asetyyლისისყილიჰოპო

Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Aspirin Zipp rakeita huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.

- Säilytä tämä seloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievene.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

Tässä selosteessa esitetään:

1. Mitä Aspirin Zipp rakeet ovat ja mihin niitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Aspirin Zipp rakeita
3. Miten Aspirin Zipp rakeita käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Aspirin Zipp rakeiden säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ ASPIRIN ZIPP RAKEET OVAT JA MIHIN NIITÄ KÄYTETÄÄN

Aspirin Zipp 500 mg rakeet sisältävät vaikuttavana aineena asetyyლისისყილიჰოპო. Asetyyლისისყილიჰოპო kuuluu salisylaattiryhmään ja sitä käytetään särky- ja kuumelääkkeenä sekä lievittämään tulehduskipuun liittyvää turvotusta. Asetyyლისისყილიჰოპო on todettu jo pienempinä annoksina vaikuttavan myös veren hyytymisominaisuuksiin. Kun rakeet ovat hajonneet mahalaukussa, vaikuttava aine imeytyy nopeasti. Lääkkeen särkyä lievittävä vaikutus alkaa nopeimmillaan 20 minuutissa, yleensä hitaammin.

Aspirin Zipp rakeiden käyttötarkoitukset ovat erilaiset särky-, reuma- ja kuumesairaudet, kuten esim. päänsärky, hammassärky, kuukautiskivut, reumaattinen lihassärky, kuume ja vilustumistaudit.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT ASPIRIN ZIPP RAKEITA

Älä käytä Aspirin Zipp rakeita

- jos olet allerginen (yliherkkä) vaikuttavalle aineelle, Aspirin Zipp rakeiden jollekin muulle aineelle tai muille samantyyppisille kipu- ja tulehduslääkkeille (salisylaateille).
- jos sinulla on taipumusta verenvuotoihin (esim. verenvuototauti eli hemofilia).
- jos sinulla on / on ollut maha- tai pohjukaissuolihaava.
- raskauden viimeisen kolmanneksen aikana.

Aspirin Zipp rakeita ei suositella käytettäväksi raskauden aikana.

Ole erityisen varovainen Aspirin Zipp rakeiden suhteen jos

- käytät samanaikaisesti veren hyytymistä estäviä lääkkeitä (esim. varfariini ja muut kumariinijohdokset tai hepariini); näiden lääkkeiden vaikutukset voivat voimistua Aspirin Zipp rakeiden käytön yhteydessä.
- sinulla on todettu maksa- tai munuaissairauksia. Muiden tulehduskipulääkkeiden tavoin valmiste voi lisätä turvotustaipumusta sydämen tai munuaisten toiminnanvajaustilailta.
- sinulla on pitkäaikaisia tai usein toistuvia ruoansulatuskanavan sairauksia.
- olet saanut allergisia oireita (esim. astmakohtauksen, ihottumia, nuhaa) muista tulehduskipu- tai reumalääkkeistä.

- sinulla on / on ollut astma tai pitkäaikaisia hengitystiesairauksia.

Valmiste kuuluu lääkeryhmään (tulehduskipulääkkeet), joka voi vaikeuttaa raskaaksi tulemistä. Tämä vaikutus kumoutuu lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen.

Asetyyliisalisyylihapovalmisteita ei suositella ensisijaiseksi kuumelääkkeeksi lapsille ja nuorille, koska virussairauksien (esim. flunssa, vesirokko) yhteydessä ne saattavat lisätä vakavan Reyen oireyhtymän vaaraa. Sen ensioireita on mm. pitkään jatkuva oksentelu.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Lääkehoidon vaikutukset tai teho voivat muuttua, jos Aspirin Zipp rakeita käytetään samanaikaisesti tiettyjen toisten lääkkeiden kanssa. Neuvottele hoitavan lääkärin kanssa ennen kuin käytät Aspirin Zipp rakeita seuraavien lääkkeiden kanssa:

- veren hyytymistä estävät lääkkeet (esim. varfariini ja muut kumariinijohdannaiset tai hepariini)
- suun kautta tai ruiskeena annosteltavat kortisonivalmisteet. Aspirin Zipp rakeiden ja kortisonivalmisteen samanaikainen käyttö voi lisätä ruoansulatuskanavan verenvuodon vaaraa.
- muut samankaltaiset tulehduskipulääkkeet
- tietyt diabeteslääkkeet (esim. glibenklamidi, glipitsidi)
- metotreksaattivalmisteet (käytetään mm. nivelreumassa ja tietyissä kasvainsairauksissa)
- sulfonamideja (sulfat) sisältävät antibioottivalmisteet
- digoksiini (sydänlääke)
- barbituraatit (esim. epilepsialääke fenobarbitaali)
- litiumia sisältävät lääkkeet (käytetään mm. mielialahäiriöiden hoidossa)
- epilepsialääke natriumvalproaatti
- nesteenpoistossa käytettävät lääkkeet (esim. spironolaktoni, furosemiidi)
- virtsahapon eritystä lisäävät kihtilääkkeet (probenesidi).

Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muitakin lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkärisi ei ole määrännyt.

Aspirin Zipp rakeiden käyttö ruuan ja juoman kanssa

- Aspirin Zipp rakeiden ja alkoholin samanaikainen käyttö voi lisätä ruoansulatuskanavan verenvuodon vaaraa.
- rakeet tulisi mieluiten ottaa aterian jälkeen.

Raskaus

Aspirin Zipp rakeiden, kuten muidenkaan salisylaatteja sisältävien lääkevalmisteiden käyttö ei ole suositeltavaa raskauden aikana, etenkin sen loppupuolella. Raskauden aikaisesta käytöstä tulisi aina neuvotella lääkärin kanssa.

Imetys

Asetyyliisalisyylihapo erittyy äidinmaitoon pieninä määrinä. Vaikka satunnaisesti otettujen pienten annosten ei ole todettu aiheuttavan haittavaikutuksia lapselle, tulisi imetyksen aikaisesta käytöstä neuvotella lääkärin kanssa.

Tärkeää tietoa Aspirin Zipp rakeiden sisältämistä aineista

- Aspirin Zipp rakeet sisältää fenyylialaniinin lähteen. Voi olla haitallinen henkilöille, joilla on fenyyliketoniauria.
- Aspirin Zipp rakeet sisältävät natriumia, mikä on otettava huomioon vähäsuolaista ruokavaliota noudatettaessa

3. MITEN ASPIRIN ZIPP RAKEITA KÄYTETÄÄN

Annostus

Aikuiset: 500-1000 mg (vastaa 1-2 annospussillista) 4-8 tunnin välein. Enimmäisannosta 4g/vuorokausi ei pidä ylittää.

Yli 12-vuotiaat lapset: 500 mg kerta-annoksena (vastaa 1 annospussillista). Annos voidaan tarvittaessa toistaa 4-8 tunnin välein, enintään 3 kertaa vuorokaudessa.

Pitkäaikaiseen käyttöön vain lääkärin ohjeen mukaan. Ei suositella ensisijaiseksi kuumelääkkeeksi lapsille.

Antotapa

Annosrakeet kaadetaan suoraan kielelle. Rakeiden annetaan liueta suussa olevaan sylkeen ennen annoksen nielemistä. Vettä ei siis tarvitse juoda lääkkeen ottamisen yhteydessä. Rakeet tulisi mieluiten ottaa aterian jälkeen.

Jos otat enemmän Aspirin Zipp rakeita kuin sinun pitäisi

Yliannostuksen oireina voi kohdassa 4 esitettyjen haittavaikutusten lisäksi esiintyä myös huimausta ja korvien soimista, erityisesti lapsilla ja vanhuksilla. Yliannostus- ja myrkytystapauksissa on otettava välittömästi yhteyttä lääkäriin tai lähimpään sairaalaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Aspirin Zipp rakeetkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat erilaiset ruoansulatuskanavan oireet, kuten mahakivut, pahoinvointi, ripuli ja oksentelu. Joskus saattaa syntyä ruoansulatuskanavan haavaumia, joihin voi liittyä verenvuotoa.

Joskus voi esiintyä allergisia oireita, kuten ihottumaa, nuhaa tai astmaa.

Koska asetyylisalisylihapo vaikuttaa veren hyytymisominaisuuksiin, haavat voivat vuotaa tavallista pitempään.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

5. ASPIRIN ZIPP RAKEIDEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Viimeinen käyttöpäivämäärä on painettu pakkaukseen. Aspirin Zipp rakeita ei tule käyttää viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

Säilytä alle 30°C.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Aspirin Zipp rakeet sisältävät

- Vaikuttava aine on Asetyyli­salisyli­hapo 500 mg

- Muut aineet ovat mannitoli, natriumvetykarbonaatti, mononatriumdivetytsitraatti, askorbiinihappo, kola-aromi (arabikumi, maltodekstriini), appelsiiniaromi (arabikumi, maltodekstriini), vedetön sitruunahappo, aspartaami (E951, fenyylialaniinin lähde)

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkoiset rakeet.

Pakkaukset: 10 annospussia pahvikotelossa.

Myyntiluvan haltija

Bayer Oy, Keilaranta 12, 02150 Espoo.

Valmistaja

Catalent Germany Schorndorf GmbH, Schorndorf, Saksa.

Markkinoija - lisätietoja antaa

Bayer Oy, Consumer Care, Keilaranta 12, PL 73, 02150 Espoo. Puhelin 020 78521, telefaksi 020 785 8214.

Tämä seloste on tarkistettu viimeksi 1.6.2008